УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Употреба	Стапка на разредување	Апликација
Рутинска дезинфекција на површини и опрема	1:100 (1%)	Со користење на апарат под притисок или друг механички распрскувач, нанесете раствор Virkon® S со стапка на апликација од 300 ml/m^2. За чувствителна опрема, меки метали и сите површини што доаѓаат во контакт со храна, исплакнете по 30 минути.
Дезинфекциони бариери за превозни средства и за обувки	1:100 (1%)	Заменете го растворот кога ќе стане видливо валкан или по период од 4–5 дена.
Аеросолно прскање во присуство на животни	1:200 (0,5%)	Нанесете како фина магла во празниот воздушен простор над и во близина на добитокот, до висина од 2 метри, користејќи апарат под притисок или друга соодветна опрема за магла подесена да испорачува фини капки (35–80 микрони). Користете двапати дневно со стапка од 20 ml по m^3 воздушен простор или 50 ml/m^2 подна површина. Не прскајте директно врз животните.

За сите алтернативни стапки на разредување (оние што не се прикажани во табелите) или за упатства за дезинфекција на вода и термално замаглување, ве молиме контактирајте го вашиот локален претставник директно.

Забелешка: За дезинфекција на површини и опрема, обезбедете минимално време на контакт од 30 минути. Фреквенцијата на примена на дезинфекциското средство ќе зависи од биосигурносните барања на поединечната локација. Консултирајте се со вашиот локален претставник за понатамошни совети.